

Vinska trta

Prilagodljivi
Program varstva

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	tebuknazol (500 g/kg), trifloksistrobin (250 g/kg)
Formulacija	WG – močljiva zrnca
Odmerek	vinska trta: 0,16 kg/ha
Pakiranje	20 g, 200 g
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Vanje trto pred odlijem 14 dni. // Odlično kurativno delovanje. // Dobro stransko delovanje na botritis. // Možnost uporabe v žitih in v vinogradu. // Najmanjša možnost pojave rezistence, ker vsebuje 3 aktivne učinkovine.



Sistemski fungicid za zatiranje odtija vinske trte.



Sistemski in kontaktni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte.

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	fosetil-AI (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)
Formulacija	WG – močljive granule
Odmerek	vinska trta: 3 kg/ha
Pakiranje	1 kg, 6 kg
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Aktivna učinkovina se razporeja navzgor in navzdol po rastlini, zato dobro varuje tudi slabše očiščene trte ali tiste z bolj bujno listno steno (npr. prostoviseče). // Ni možnosti rezistence (3 različne aktivne učinkovine). // Povečuje naravno odpornost rastline.

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	tebuknazol (167 g/L), spiroksamin (250 g/L), triadimenol (43 g/L)
Formulacija	EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek	vinska trta: 0,3–0,4 L/ha
Pakiranje	40 mL, 100 mL, 1 L, 5 L
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Če je prisotna tudi peronospora lahko Falcon® kombinira s pripravkom Mikal® premium F, ki prav tako dolgo vanje trto. // Možnost uporabe v žitih in v vinogradu. // Najmanjša možnost pojave rezistence, ker vsebuje 3 aktivne učinkovine.



Sistemski fungicid za zatiranje odtija vinske trte in boleznih žit.



Sistemski in kontaktni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte.

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	fosetil-AI (666,7 g/kg), fluopikolid (44,4 g/kg)
Formulacija	WG – močljive granule
Odmerek	vinska trta: 3 kg/ha
Pakiranje	250 g, 1 kg
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Izjemno dobro varuje grozdčiče in zalistnike. // Dolgotrajno delovanje – omogoča razmik med škropljenji 14 dni. // Kratka karenca. // Ni možnosti pojave navzkrižne rezistence (edinstvena aktivna učinkovina fluopikolid). // Povečuje naravno odpornost rastline.



Fungicid za zatiranje cvetne monilije, sadne gnilobe in sive grozdnice plesni (botritisa).

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	fenheksamid (500 g/L)
Formulacija	SC – koncentrirana suspenzija
Odmerek	vinska trta: 1–1,5 L/ha
Pakiranje	10 mL, 100 mL, 1 L
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Po rezultatih neodvisnih poskusov najučinkovitejši pripravek za zatiranje botritisa v Sloveniji. // Registriran za veliko število kultur. // Kratka karenca za sadne vrste. // Ne vpliva na vrtno mošta (ob upoštevanju karence). // Ni možnosti navzkrižne rezistence.

!!!!!!!!!!!!

- Za preprečevanje botritisa v vinogradih je pomemben čas uporabe.
- Ključno je prvo tretiranje s pripravkom Teldor® v času zapiranja grozdov.
- Za preprečevanje botritisa na vinski trti zadostuje škropljenje samo cone grozolja (odmerek 0,8 L/4.000 trt).



Fuopiram in tebuknazol sta nepremagljivi dvejec. Zdržena v edinstvenem fungicidu Luna® Experience.



Fungicid za zatiranje glivičnih boleznih na trti, na jablanah in brusnicah, na češnjah in višnjah, v glavnem zelju, ohrovtu, brsticem ohrovtu, brokoliju, cvetači, poru, korenju, čebuli in česnu.

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	fluopiram 200 g/L, tebuknazol 200 g/L
Formulacija	SC – koncentrirana suspenzija
Odmerek	vinska trta: 0,4 L/ha
Pakiranje	40 mL, 100 mL, 1 L
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Zredna učinkovitost in najširši spekter delovanja. // Nova aktivna učinkovina omogoča uspešno antirezistenčno strategijo. // Sistemsko delovanje zagotavlja učinkovito varstvo delov rastline, ki niso bili neposredno tretirani. // Vinuska zaščita, ki dolgočasno izboljša zdravje tretirane rastline in plodov ob skladiščenju.

!!!!!!!!!!!!

- Pripravek je nevaren za čebele. S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrašč. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev, tretiramo najprej 2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času najkasneje 2 uri pred sončnim vzhodom.

Delovanje	<input type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/> Lokosistemsko
Aktivna učinkovina	fluopiram 200 g/L, tebuknazol 200 g/L
Formulacija	SC – koncentrirana suspenzija
Odmerek	vinska trta: 0,4 L/ha
Pakiranje	40 mL, 100 mL, 1 L
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Zredna učinkovitost in najširši spekter delovanja. // Nova aktivna učinkovina omogoča uspešno antirezistenčno strategijo. // Sistemsko delovanje zagotavlja učinkovito varstvo delov rastline, ki niso bili neposredno tretirani. // Vinuska zaščita, ki dolgočasno izboljša zdravje tretirane rastline in plodov ob skladiščenju.



Sistemski insekticid za zatiranje ameriškega in zelenega škrtatka v vinski trti.

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Želodčno <input type="checkbox"/> Preventivno <input type="checkbox"/> Kurativno <input type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	flupiradifuron 200 g/L
Formulacija	SL – vodotopni koncentrat
Odmerek	vinska trta: 0,5 L/ha
Pakiranje	200 mL, 1 L
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Novi standard za kontrolo ciljnih sesajočih insektov na sadnem drevju, zelenjavi in vinski trti. // Novost pri zatiranju ameriškega škrtatka v vinski trti – prenašalec zlate trsne rumenice. // Nova aktivna učinkovina flupiradifuron zagotavlja najvišji varnostni standard – prijazen do okolja hkrati pa učinkovit proti škodljivim insektom. // Hitro pretakanje po rastlini povzroča tudi hitro delovanje na škodljivce in prenehanje hranjenja. // Prilagodljiv čas uporabe.

!!!!!!!!!!!!

- Pripravek je nevaren za čebele. S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrašč. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev, tretiramo najprej 2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času najkasneje 2 uri pred sončnim vzhodom.



Kontaktni insekticid za zatiranje širokega spektra škodljivcev.

Delovanje	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktno <input type="checkbox"/> Sistemsko <input type="checkbox"/> Preventivno <input type="checkbox"/> Kurativno <input type="checkbox"/> Eradikativno
Aktivna učinkovina	deltametrin (25 g/L)
Formulacija	EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek	vinska trta: 0,5 L/ha
Pakiranje	200 mL, 1 L
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> // Cenovno ugoden insekticid. // Zatiira širok spekter škodljivcev. // Deluje izjemno hitro.

!!!!!!!!!!!!

- Pripravak Decis® EC 25 ne uporabljamo pri visokih temperaturah (28 °C in več), saj hlapi.
- Žitni strgač v toplih in vlažnih letih, v kratkem času povzroči veliko škodo, zato priporočamo tretiranje takoj, ko število doseže prag škodljivosti.
- Pripravek je nevaren za čebele! S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrašč. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev, tretiramo najprej 2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času najkasneje 2 uri pred sončnim vzhodom.










Izdal:
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

- Baycrop Science SI
- www.cropscience.bayer.si
- agro.info.si@bayer.com
- 01/581 44 47
- 01/581 44 46

Fitofarmacivsko sredstvo uporablja varno nastalo med tiskom brošure, niso izključene. dan 1. januar 2017. Morbline napake, ki so nastala, ne jamčimo. Brošura trza stane na našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi osnovi najnovjših dogovor, vendar brez odgovor- osebni in števili poskusi. Svetujemo na je o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na Fred uporabo vedno prebrati etiketo in informaci- Fitofarmacivsko sredstvo uporablja varno nastalo med tiskom brošure, niso izključene.

Program varstva vinske trte



									
	odganjanje očes	razvoj listov (3-4 listi)	mladice (8-15 cm)	pojav socvetij (30-50 cm)	cvetenje	po cvetenju	rast plodičev	zapiranje grozdja	zorenje
peronospora vinske trte		kontaktni pripravki po potrebi	Mikal[®] FLASH 4 kg/ha	Mikal[®] premium F 3 kg/ha (3-krat zaporedoma)	Mikal[®] premium F 3 kg/ha (3-krat zaporedoma)	Mikal[®] premium F 3 kg/ha (3-krat zaporedoma)	PRO-FILER[®]* 3 kg/ha	kontaktni ali sistemični pripravki po potrebi	kontaktni pripravki po potrebi
črna gozdna pegavost	kontaktni pripravki								
oidij	žvepleni pripravki	žvepleni pripravki	NATIVO[®] 0,16 kg/ha	Luna[®] EXPERIENCE 0,4 L/ha	FALCON[®] 0,3–0,4 L/ha	Luna[®] EXPERIENCE 0,4 L/ha	FALCON[®] 0,3–0,4 L/ha	NATIVO[®] 0,16 kg/ha	
siva gozdna plesen							TELDOR[®] 1–1,5 L/ha	TELDOR[®] 1–1,5 L/ha	
navadna in rdeča sadna pršica	žvepleni pripravki								
križasti grozdni sukač pasasti grozdni sukač							decis[®] 0,5 l/ha	decis[®] 0,5 l/ha	
ameriški škržatek						SIVANTO[®] prime 0,5 l/ha			

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

*Pri nameravani uporabi FFS Luna[®] Experience in Profiler[®] v isti rastni sezoni, lahko vsak pripravek uporabimo samo 1-krat!
Mešanje pripravkov Luna[®] Experience in Profiler[®] ne priporočamo.