


Pščenica

Pripravki Program varstva



- Priprava Biscaya® uporabimo, čim opazimo napad škodljivcev (predvsem usj).
- Zaradi OD formulacije se pripravke dobro razporedi po površni rastline in se hitreje vpije v rastlino, kjer se sistemsko-aktivna učinkovina nahaja v celicah, vsebnost v plasteh ni no razporeja. Pred uporabo pripravka, vsebnost v plasteh ni dobro pretresemo.
- Sistemskih insekticidov ne smemo uporabljati v času cvetenja gojenih rastlin ali podrastl.

Delovanje	Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input type="checkbox"/> Kurativno <input type="checkbox"/> Eradikativno <input type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	takoprid (240 g/L)
Formulacija	OD – oljna disperzija
Odmerek	žita, kornjir, oljna ogrščica: 0,3 L/ha
Pakiranje	1 L
Prednosti	




Sistemski insekticid, ki zagotavlja hitro in dolgotrajno delovanje na številne škodljive žuželke.




Sistemski herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi.

Delovanje	Preko listov <input checked="" type="checkbox"/> Preko tal <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	foramsulfuron (31,5 g/L) tienkarbazon-metil (10 g/L)
Formulacija	OD – oljna disperzija
Odmerek	1,5–2 L/ha
Pakiranje	1 L, 5 L
Prednosti	

- // Zaradi talnega delovanja štiti posevke pred naknadnim vznikom enoletnih plevelov.
- // 2 uri po škropljenju ga dež ne more izprati.
- // Vsebuje močilo, ki omogoča aktivni učinkovini boljše delovanje.
- // Zaradi vsebnosti varovala, ne zavira rasti kornje.
- // Dovoljen na vodovarstvenem območju.



- Pred uporabo embalažo s pripravkom dobro pretresemo.
- Ne škropimo pri temperaturah nad 30 °C.
- Izgubiti se moramo podvajanju škropljenja!
- V primeru visoke zaplevljenosti s slakom dodamo olovičen odmerek pripravka na podlagi dikambe.



- Priprava Decis® EC 25 ne uporabljamo pri visokih temperaturah (28 °C in več), saj hlapi.
- Zrni strgajo v toplih in vlažnih letih, v kratkem času povzročijo veliko škodo, zato priporočamo tretiranje takoj, ko število doseže prag škodljivosti.
- Pripravek je nevaren za čebelarje! S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrastl. Zaradi zračne čebel in drugih žuželk oprasevalcev, tretiramo najprej 2 uri po sonnem zahodu in v nočnem času.

Delovanje	Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input type="checkbox"/> Preventivno <input type="checkbox"/> Kurativno <input type="checkbox"/> Eradikativno <input type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	deltametrin (25 g/L)
Formulacija	EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek	žita, kornja, oljna ogrščica: 0,3 L/ha
Pakiranje	200 mL, 1 L
Prednosti	




Kontaktni insekticid za zatiranje širokega spektra škodljivcev.




Selektivni herbicid iz skupine sulfonilsečnin za zatiranje plevelov v ozimni pšenici in ozimni tritikali.

Delovanje	Preko listov <input checked="" type="checkbox"/> Preko tal <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	jodosulfuron metil Na 9 g/kg mezosulfuron metil 45 g/kg tienkarbazon metil 22,5 g/kg mefenpir-dietil (varovalo) 135 g/kg
Formulacija	WG – močljiva zrnca
Odmerek	ozimna pšenica, tritikala: 0,2 kg/ha v primeru zaplevljenosti s srakopercem (<i>Apera spica-venti</i>), latovkami (<i>Poa</i> spp.) in z enoletnimi širokolistnimi pleveli ozimna pšenica, tritikala: 0,333 kg/ha v primeru zaplevljenosti s trdovratnejšimi ozkolistnimi pleveli, kot so njivski lisičji rep (<i>Alopecurus myosuroides</i>), ljuljke (<i>Lolium</i> spp.), stoklase (<i>Bromus</i> spp.) in gluhi oves (<i>Avena fatua</i>), ter širokolistnimi pleveli, kot je npr. plezajoča lakota (<i>Galium aparine</i>)
Pakiranje	1 kg
Prednosti	

- // Najmočnejša kombinacija aktivnih učinkovin iz skupine sulfonilsečnin za zatiranje ozkolistnih plevelov.
- // Največja zanesljivost, ker deluje preko listov in preko tal.
- // Deluje sistemsko, zato se ne izpira z dežjem in deluje dolgotrajno.
- // Brez omejitev pri kolobarju.
- // Nizek odmerek.



- S pripravkom tretiramo samo v spomladanskem času od fenološke faze, ko ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13–32).
- Priporočamo, da dodate močilo za herbicide Biopower® 0,6–1 L/ha.



- Najboljšo učinkovitost proti fuzaozam klasa dosežemo, če pripravke Prosaro® uporabimo kadar so na pšenici, rži in tritikali vidni prvi prahniki na klasu.
- Pri jecmenu pripravke Prosaro® uporabimo, ko so iz bili vidne dva tretinjama ne sme biti krajši od 14 dni.

Delovanje	Kontaktno <input type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/> Eradikativno <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	tebukonazol (125 g/L) protrikonazol (125 g/L)
Formulacija	EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek	pšenica, jecmen, rž, tritikala: 1 L/ha
Pakiranje	1 L, 5 L
Prednosti	




Sistemski fungicid za zatiranje boleznih žit.




Sistemski herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v navadni pšenici.

Delovanje	Preko listov <input checked="" type="checkbox"/> Preko tal <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	jodosulfuron-metil natrij 7,5 g/L mezosulfuron metil 9 g/L diflufenkan 120 g/L mefenpir-dietil (varovalo) 27 g/L
Formulacija	OD – oljna disperzija
Odmerek	ozimna pšenica: 1 L/ha
Pakiranje	1 L, 5 L
Prednosti	

- // Idealen za jesensko in zgodnje spomladansko zatiranje plevelov.
- // Edinstvena kombinacija treh preverjenih aktivnih učinkovin.
- // Sistemsko delovanje na ciljne plevel.
- // Izboljšano delovanje na širokolistne in ozkolistne plevel.



- Za boljši pretok aktivnih učinkovin po plevelu, naj bodo v času škropljenja temp. nad 5 °C.
- Pri temperaturah 2–5 °C je delovanje nekoliko počasnejše, vendar končna učinkovitost ni zmanjšana.
- Preprečiti moramo zanašanje na sosednje posevke, še posebej na lucerno, grah in oljno ogrščico.



- Sredstvo lahko uporabimo v pšenici, rži in tritikali največ dvakrat v rastni sezoni, v jecmenu in ovsu pa največ enkrat. Razmak med dvema tretinjama ne sme biti krajši od 14 dni.

Delovanje	Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	fluopiram 65 g/L protrikonazol (130 g/L)
Formulacija	EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek	pšenica, rž, tritikala: 1,5 L/ha jecmen, oves: 1,2 L/ha
Pakiranje	1 L, 5 L
Prednosti	




Sistemski fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici, jecmenu, rži, ovsu in tritikali.




Herbicid za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih plevelov v ozimni in jari pšenici ter jecmenu, rži in tritikali.

Delovanje	Preko listov <input checked="" type="checkbox"/> Preko tal <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	jodosulfuron-metil-natrij (100 g/L)
Formulacija	OD – oljna disperzija
Odmerek	pšenica, jecmen, rž, tritikala: 0,1 L/ha
Pakiranje	100 mL, 1 L
Prednosti	

- // Po 2 urah ga dež ne more izprati.
- // Herbicid z najširšim spektrom zatiranja plevelov v žitih.
- // Z enim škropljenjem zatremo vse najpomembnejše plevela v žitih.
- // Odlično zatira plezajočo lakoto (smolenec) tudi v poznejših razvojnih stadijih.
- // Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.



- Hussar® OD lahko uporabimo že pri temperaturah nad 5 °C. Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove učinkovitosti.
- Ko škropimo, morajo biti listi plevelov suhi. Priprava Hussar® OD ne smemo uporabljati, če so razmere stresne (suša, mraz, stoječa voda).



- Počakajmo, da se zgornji list (zastavkar) popolnoma razvije in da na njem nastane vosčena prevleka.
- Ne škropite po močnem soncu in pri visokih temperaturah.
- Skropilne opravile v jutranjih ali večernih urah, ko so temperature nižje.
- Uporabite vsaj 200 L vode na hektar.

Delovanje	Kontaktno <input checked="" type="checkbox"/> Sistemsko <input checked="" type="checkbox"/> Preventivno <input checked="" type="checkbox"/> Kurativno <input checked="" type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	tebukonazol (166 g/L) biksafen (60 g/L)
Formulacija	EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek	pšenica, rž, tritikala, jecmen, oves: 1,2–1,5 L/ha
Pakiranje	1 L, 5 L
Prednosti	




Nov sistemski fungicid za zatiranje najpomembnejših bolezni žit.



Herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov ter nekaterih ozkolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem jecmenu, rži in tritikali.


Delovanje	Preko listov <input checked="" type="checkbox"/> Preko tal <input type="checkbox"/>
Aktivna učinkovina	amidosulfuron (100 g/L) jodosulfuron-metil-natrij (25 g/L)
Formulacija	OD – oljna disperzija
Odmerek	pšenica, jecmen, rž, tritikala: 0,15 L/ha
Pakiranje	50 mL, 150 mL, 1 L
Prednosti	

- // Po 2 urah ga dež ne more izprati.
- // Učinkovito zatira širok spekter širokolistnih plevelov, izredno je selektiven za žita.
- // Lahko se meša s fungicidi in tekočimi gnojili.
- // Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.




- Sekator® OD lahko uporabimo že pri temperaturah nad 5 °C.
- Ko škropimo, morajo biti listi plevelov suhi.
- Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove učinkovitosti.
- V primeru večje zaplevljenosti z osatom priporočamo dodajanje močila.
- Poškodovanega pridelka ne škropimo (npr. mraz, boleznih in druge poškodbe).

// Program varstva pšenice



// Program varstva koruze



Fitofarmaceutsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

**Na vaša vprašanja
odgovarjamo:**

Andrej Skrt
051 672 102

Ladislav Kerek
051 641 199

Marko Frank
030 705 446

Gal Motore
040 475 199

Božana Stojić
070 866 514