

# *Vinska* **trta**

*Program varstva*



**Fungicid**

**Luna<sup>®</sup>**  
**MAX**



*Luna<sup>®</sup> Max je fungicid za zatiranje oidija vinske trte.*

**Delovanje**

sistemično, preventivno, kurativno

**Aktivna učinkovina**

fluopiram 75 g/L, spioksamin 200 g/L

**Formulacija**

suspenzoemulzija – SE

**Odmerek**

vinska trta: 1 L/ha

**Pakiranje**

200 mL, 1 L

- // Učinkovito varstvo lista in plodov: večina aktivne snovi ostane na površini.
- // Dolgotrajna zaščita: manjša količina aktivne snovi prodira počasi v list.
- // Akropetalna sistemičnost: premeščanje aktivne snovi po listu akropetalno.
- // Translaminarna učinkovitost: učinkovito varstvo delov rastline, ki niso bili direktno tretirani.
- // Izjemna učinkovitost.
- // Visoka odpornost na izpiranje.
- // Učinkovita anti-rezistentna strategija.
- // Preventivno in kurativno delovanje.

**PROSPER®**



*Prosper® je sistemski fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem na vinski trti.*

**Delovanje**

kontaktno, sistemsko, preventivno, kurativno

**Aktivna učinkovina**

spiroksamin (300 g/l)

**Formulacija**

kapsulirana suspenzija – CS

**Odmerek**

vinska trta: 1 L/ha

**Pakiranje**

250mL, 1 L

- // Visoka učinkovitost proti pepelasti plesni.
- // Izjemna sistemskost in učinkovitost pri visokih temperaturah.
- // Prilagodljiv pri uporabi.
- // Učinkovit in varen.
- // Lahko ga uporabimo 2x v eni sezoni.
- // Glede na pritisk bolezni v zgodnejših fazah razvoja vinske trte do začetka cvetenja (BBCH 61), se lahko uporablja zmanjšan odmerek 0,7 L/ha.

**Fungicid**

**TELDOR®**



*Fungicid za zatiranje cvetne monilije, sadne gnilobe in sive grozdne plesni (botritisa).*

**Delovanje**

kontaktno, preventivno

**Aktivna učinkovina**

fenheksamid (500 g/L)

**Formulacija**

SC – koncentrirana suspenzija

**Odmerek**

vinska trta: 1,5 L/ha

**Pakiranje**

100 mL, 1 L

- // Po rezultatih neodvisnih poskusov najučinkovitejši pripravek za zatiranje botritisa v Sloveniji.
- // Registriran za veliko število kultur.
- // Kratka karencja za sadne vrste.
- // Ne vpliva na vrenje mošta (ob upoštevanju karence).
- // Ni možnosti navzkrižne rezistence.
- // Za preprečevanje botritisa v vinogradih je pomemben čas uporabe.
- // Ključno je prvo tretiranje s pripravkom Teldor® v času zapiranja grozdov.
- // Za preprečevanje botritisa na vinski trti zadostuje škropljenje samo cone grozdja (odmerek 0,8 L/4.000 trt).

NATIVO®



*Sistemični fungicid za zatiranje oidija vinske trte.*

### **Delovanje**

kontaktno, sistemsko, preventivno, kurativno

### **Aktivna učinkovina**

tebukonazol (500 g/kg), trifoksistrobin (250 g/kg)

### **Formulacija**

WG - močljive granule

### **Odmerek**

vinska trta: 0,16 kg/ha

### **Pakiranje**

200 g, 1 kg

- // Zaščita vinske trte pred oidijem 10–12 dni.
- // Odlično kurativno delovanje.
- // Dobro sekundarno delovanje na sivo plesen.
- // Kratka karenca (14 dni).
- // Nativo® zaradi dolgoročne učinkovitosti priporočamo kombiniranje s pripravkoma proti peronospori, in sicer Mikal® Premium F ali Profiler®.
- // Nativo® se lahko meša z izdelki na osnovi žvepla.



*Fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na trti, na jablanah in hruškah, na češnjah in višnjah, v glavnem zelju, ohrovту, brstičnem ohrovту, brokoliju, cvetači, poru, korenju, čebuli in česnu.*

### **Delovanje**

sistemično, preventivno, kurativno

### **Aktivna učinkovina**

fluopiram 200 g/L, tebukonazol 200 g/L

### **Formulacija**

SC – koncentrirana suspenzija

### **Odmerek**

vinska trta: 0,4 L/ha

### **Pakiranje**

100 mL, 1 L, 5 L

- // Izredna učinkovitost in najširši spekter delovanja.
- // Nova aktivna učinkovina omogoča uspešno antirezistenčno strategijo.
- // Sistemično delovanje zagotavlja učinkovito varstvo delov rastline, ki niso bili neposredno tretirani.
- // Vrhunska zaščita, ki dolgoročno izboljša zdravje tretirane rastline in plodov ob skladiščenju.
- // Za uspešno pripravo škropilne brozge je pomemben vrstni red dodajanja pripravkov. Naša priporočila so sledeča:  
1. SL, 2. SC, KS, FL, 3. WP, 4. WG, DF, 5. SE, 6. EC, 7. EW, 8. OD, 9. močila, 10. listna gnojila.



***Sistemični in kontaktni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte.***

***Delovanje***

kontaktno, sistemsko, preventivno

***Aktivna učinkovina***

fosetil-Al (666,7 g/kg), fluopikolid (44,4 g/kg)

***Formulacija***

WG – močljive granule

***Odmerek***

vinska trta: 3 kg/ha

***Pakiranje***

250 g, 1 kg

- // Izjemno dobro varuje grozdice in zalistnike.
- // Dolgotrajno delovanje – omogoča razmik med škropljenji 14 dni.
- // Kratka karenc.
- // Ni možnosti pojava navzkrižne rezistence (edinstvena aktivna učinkovina fluopikolid).
- // Povečuje naravno odpornost rastline.
- // Če so okužbe s peronosporo že prisotne priporočamo Mikal® Premium F.
- // Mešanje pripravkov Luna® Experience in Profiler® ne priporočamo.



**Fungicid**

**Mikal<sup>®</sup>**  
FLASH



***Sistemični in kontaktni fungicid za zatiranje peronospore in črne pegavosti vinske trte.***

***Delovanje***

kontaktno, sistemsko, preventivno

***Aktivna učinkovina***

fosetil-Al 500 g/kg, folpet 250 g/kg

***Formulacija***

WG – močljive granule

***Odmerek***

vinska trta: 3–4 kg/ha

***Pakiranje***

250 g, 1 kg, 12 kg

- // Edini pravi sistemik iz skupine fungicidov na tržišču.
- // V rastlino se vpije že v 30 minutah in ga dež ne more več izprati.
- // Po rastlini se aktivno razporedi že 1 uro po aplikaciji.
- // Veča naravno odpornost vinske trte.
- // Pripravek uporabite preventivno. Če ste opazili znake okužbe, uporabite pripravek Mikal<sup>®</sup> Premium F, ki ima tudi kurativno delovanje.



**Fungicid**

**Mikal<sup>®</sup>**  
premium F



**Sistemični in kontaktni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte.**

**Delovanje**

kontaktno, sistemsko, preventivno, kurativno

**Aktivna učinkovina**

fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)

**Formulacija**

WG – močljive granule

**Odmerek**

vinska trta: 3 kg/ha

**Pakiranje**

200g, 1 kg, 6 kg

// Aktivna učinkovina se razporeja navzgor in navzdol po rastlini, zato dobro varuje tudi slabše očiščene trte ali tiste z bolj bujno listno steno (npr. prostoviseče).

// Ni možnosti rezistence (3 različne aktivne učinkovine).

// Povečuje naravno odpornost rastline.

// Pripravek priporočamo uporabiti vsaj 3-krat zapored. Najbolje je, če prvo škropljenje opravimo s pripravkom Mikal<sup>®</sup> Premium F pred cvetenjem in potem še 2-krat po cvetenju. Razmaki med škropljenji naj bodo 12 dni.

// Najbolj zanesljivo delovanje.

**Insekticid**

**SIVANTO<sup>®</sup>**  
prime



*Sistemični insekticid za zatiranje ameriškega in zelenega škržatka v vinski trti.*

**Delovanje**

kontaktno, sistemsko

**Aktivna učinkovina**

flupiradifuron 200 g/L

**Formulacija**

SL – vodotopni koncentrat

**Odmerek**

vinska trta: 0,5 L/ha

**Pakiranje**

100 mL, 1 L

- // Novi standard za kontrolo ciljnih sesajočih insektov na sadnem drevju, zelenjavi in vinski trti.
- // Namenjen zatiranju ameriškega škržatka v vinski trti – prenašalec zlate trsne rumenice.
- // Nova aktivna učinkovina flupiradifuron zagotavlja najvišji varnostni standard – prijazen do okolja hkrati pa učinkovit proti škodljivim insektom.
- // Hitro pretakanje po rastlini povzroča tudi hitro delovanje na škodljivce in prenehanje hranjenja.
- // Prilagodljiv čas uporabe.
- // Pripravek je nevaren za čebele. S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti.



**Kontaktne insekticid za zatiranje ameriškega škržatka in križastega grozdnega sukača na vinski trti.**

## **Delovanje**

kontaktno, želodčno

## **Aktivna učinkovina**

deltametrin 100 g/L

## **Formulacija**

EC – koncentrat za emulzijo

## **Odmerek**

vinska trta: 0,075 L/ha

## **Pakiranje**

10mL, 50 mL, 250 mL, 1 L

- // Izjemno hitro delovanje.
- // Širok spekter delovanja v velikem številu kultur.
- // Močno se veže na površinski del rastline.
- // Zmanjšana je možnost izpiranja.
- // Lahko se kombinira z vsemi fungicidi podjetja Bayer.
- // Kontaktni želodčni insekticid s hitrim delovanjem.
- // Pripravek je nevaren za čebele! Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev, tretiramo najprej 2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času najkasneje 2 uri po sončnem vzhodu.
- // Priprava ne uporabljamo pri visokih temperaturah (>28°C in več) saj hlapi.



*Preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov.*

**Delovanje**

preventivno

**Aktivna učinkovina**

Bacillus amyloliquefaciens (sev QST 713), 13,96 g/L (min.  $1.042 \times 10^{12}$  cfu/L oz.  $1 \times 10^{12}$  cfu/kg)

**Formulacija**

SC – koncentrirana suspenzija

**Odmerek**

vinska trta: 4 L/ha

**Pakiranje**

1 L

- // Serenade® ASO je registriran tudi za uporabo v EKOLOŠKI pridelavi.
- // Serenade® ASO je izjemno fleksibilen, saj ga lahko uporabljate samostojno ali kot del integriranega škropilnega programa.
- // Pridelki so brez ostankov aktivnih učinkovin v/na plodovih.
- // Kompatibilen pri mešanju s klasičnimi pripravki za varstvo rastlin (fungicidi, insekticidi in herbicidi) in gnojili.
- // Odlično se vključuje v antirezistenčno strategijo.
- // Registriran v številnih kulturah.
- // Širok spekter delovanja na številne glive.
- // Brez karence in v plodovi so brez ostankov (MLR), mogoča uporaba pred samim obiranjem.



# Bayer



01/581 44 44



01/581 44 47



agro.info.si@bayer.com



www.cropscience.bayer.si



Bayer Crop Science SI

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na obsežnih in številnih poskusih. Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez odgovornosti, ker sta uporaba in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne jamčimo. Brošura izraža stanje na dan 1. januar 2026. Morebitne napake, ki so nastale med tiskom brošure, niso izključene.

**IZDAL:**

**Bayer d.o.o.  
Bravničarjeva 13  
1000 Ljubljana**



# Program varstva vinske trte



|                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <div>odganjanje<br/>očes</div> |  <div>razvoj listov<br/>(3-4 listi)</div> |  <div>mladice<br/>(8-15 cm)</div> |  <div>pojav socvetij<br/>(30-50 cm)</div> |  <div>cvetenje</div>                     |  <div>po cvetenju</div>                  |  <div>rast plodičev</div> |  <div>zapiranje<br/>grozdja</div> |  <div>zorenje</div> |
| peronospora vinske trte                                                           |                                                                                                                  | kontaktni pripravki po potrebi                                                                                             |  <div>4 kg/ha</div>               |  <div>3 kg/ha</div>                       |  <div>3 kg/ha</div>                      |  <div>3 kg/ha</div>                      |  <div>3 kg/ha</div>       | kontaktni ali sistemični pripravki po potrebi                                                                        | kontaktni pripravki po potrebi                                                                         |
| črna gozdna pegavost                                                              | kontaktni pripravki                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| oidij                                                                             | žvepleni pripravki                                                                                               |                                                                                                                            |  <div>0,16 kg/ha</div>            |  <div>1 L/ha</div>                       |  <div>0,4 L/ha<br/>ali<br/>1 L/ha</div> |  <div>0,4 L/ha<br/>ali<br/>1 L/ha</div> |  <div>1 L/ha</div>       |  <div>0,16 kg/ha</div>            |                                                                                                        |
| siva gozdna plesen                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                             |  <div>1,5 L/ha</div>                   |                                                                                                              |  <div>4 L/ha</div>              |                                                                                                        |
| navadna in rdeča sadna pršica                                                     | žvepleni pripravki                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| križasti grozdni sukač<br>pasasti grozdni sukač                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |  <div>0,075 L/ha</div>  |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| ameriški škržatek                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                             |  <div>0,5 L/ha</div>                   |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                        |

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

\*Pri nameravani uporabi FFS Luna<sup>®</sup> Experience in Profiler<sup>®</sup> v isti rastni sezoni, lahko vsak pripravek uporabimo samo 1-krat!  
Mešanje pripravkov Luna<sup>®</sup> Experience in Profiler<sup>®</sup> ne priporočamo.

Na vaša vprašanja  
odgovarjamo:

Ladislav Kerek  
051 641 199

Marko Frank  
030 705 446

